



### HASTA BİLGİLENDİRME ve RIZA BELGESİ

Form No:

Hasta barkodunu buraya yapıştırınız

...../...../.....  
.....:.....  
Tıbbi Müdahaleyi Yapanın Adı Soyadı ve İmzası

Not:Hasta veya hasta yakını "Hasta İmzası" bölümüne el yazısı ile "Okudum, anladım" yazarak imzalayacaktır.

#### DIŞ TAŞI TEMİZLİĞİ

Polikliniklerimizde Diş Hekimlerimiz tarafından lokal anestezi ile yapılır. Gerekliğinde aynı konuda tıbbi yardıma polikliniklerimize başvurarak alabilirsiniz.

Tedaviden Beklenen Fayda	Tedavinin Olası Riskleri	Tedavi Yapılmazsa	Tedavinin Alternatifi	Ort. Süre	Kullanılacak İlaç ve Olası Yan Etkileri	Hasta İmzası
- Diş eti kanamalarının giderilmesi. -Ağız kokusunun giderilmesi	- Tedavi sonrası dişlerde soğuk-sıcak hassasiyeti. - Diş aralarında boşluk hissi gelişmesi. - Diş taşının maskeleydiği diş sallanmaları açığa çıkabilir.	-Enfeksiyona ve diş eti çekilmesine bağlı olarak dişler kaybedilebilir.	Yoktur.	15 dakika.	Lokal anestezi, anksiyete, korku, huzursuzluk, baş dönmesi, baş ağrısı, çarpıntı, hipotansiyon, hipertansiyon, bulantı, kusma yapabilir.	

#### DIŞ ÇEKİMİ

Polikliniklerimizde Diş Hekimlerimiz tarafından lokal anestezi ile yapılır. Gerekliğinde aynı konuda tıbbi yardıma polikliniklerimize başvurarak alabilirsiniz.

Tedaviden Beklenen Fayda	Tedavinin Olası Riskleri	Tedavi Yapılmazsa	Tedavinin Alternatifi	Ort. Süre	Kullanılacak İlaç ve Olası Yan Etkileri	Hasta İmzası
-Ağrı şikayetinin giderilmesi -Enfeksiyonun engellenmesi	-Dişte ya da kemikte kırılma. -Uzun süre kanama, enfeksiyon ve ağrı. -Artık kökün çıkarılamaması. -Komşu dişe zarar gelmesi. -Çene ekleminin zedelenmesi - Ağrı, şişlik, geçici his kaybı, alerjik reaksiyon, geçici yüz felci meydana gelebilir.	-Ağrı şikayeti artarak devam eder -Yaygın enfeksiyon gerçekleşebilir. -Fonksiyon kaybı ve ağız kokusu.	Yoktur.	10-20 dakika.	Lokal anestezi, anksiyete, korku, huzursuzluk, baş dönmesi, baş ağrısı, çarpıntı, hipotansiyon, hipertansiyon, bulantı, kusma yapabilir.	

#### DOLGU ve KANAL TEDAVİSİ

Polikliniklerimizde Diş Hekimlerimiz tarafından lokal anestezi ile yapılır. Gerekliğinde aynı konuda tıbbi yardıma polikliniklerimize başvurarak alabilirsiniz.

Tedaviden Beklenen Fayda	Tedavinin Olası Riskleri	Tedavi Yapılmazsa	Tedavinin Alternatifi	Ort. Süre	Kullanılacak İlaç ve Olası Yan Etkileri	Hasta İmzası
-Ağrı şikayetinin giderilmesi -Çürüme durdurma ve olası diş çekimini önleme. -Estetiğin ve çiğneme fonksiyonunun yeniden kazanılması.	-Çürüğün büyüklüğüne bağlı olarak dişe kırılma. -Dolgu düşmesi,ısı hassasiyeti ve ağrı -Tedavi sırasında sinirlerin açılması -Dolgu sonrasında ağrının devam etmesi - Kanal aletinin kırılması. - Ağrı, şişlik, geçici his kaybı, alerjik reaksiyon, geçici yüz felci	-Çürüğün ilerleyerek ağız kokusuna neden olabilir. -Mevcut ağrı ve şikayetlerinin devam etmesi -Tedavi edilemez duruma geldiğinde dişin çekilmesi. -Estetik bozukluk.	-Dişin çekilmesi.	30 dakika.	Lokal anestezi, anksiyete, korku, huzursuzluk, baş dönmesi, baş ağrısı, çarpıntı, hipotansiyon, hipertansiyon, bulantı, kusma yapabilir.	

#### HAREKETLİ (KİSMİ YA DA TAM) PROTEZ

Polikliniklerimizde Diş Hekimlerimiz tarafından yapılır. Gerekliğinde aynı konuda tıbbi yardıma polikliniklerimize başvurarak alabilirsiniz.

Tedaviden Beklenen Fayda	Tedavinin Olası Riskleri	Tedavi Yapılmazsa	Tedavinin Alternatifi	Ort. Süre	Kullanılacak İlaç ve Olası Yan Etkileri	Hasta İmzası
-Çiğneme, konuşma fonksiyonundaki bozuklukların giderilmesi. -Estetik sorunların giderilmesi	-Protezin ağızda konuşmayı bozması. -Protez üzerindeki dişlerin düşmesi. -Protezin altında gıda artığı birikmesi. -Çok etkili ısırma ve koparma yapılamaması. -Kanca (kroşe) gelen dişlerin zarar gelmesi -Vuruklara bağlı ağrı ya da yaraya sebep olması. -Nadiren alerji gelişmesi.	-Çene eklemi problemi. -Çiğneme kaybına bağlı mide problemi. -Mevcut dişlerde boşluğa doğru uzama ve kaymalar.	-İmplant -Farklı protez tipleri	15 iş günü		

#### SABİT PROTEZ

Polikliniklerimizde Diş Hekimlerimiz tarafından lokal anestezi ile yapılır. Gerekliğinde aynı konuda tıbbi yardıma polikliniklerimize başvurarak alabilirsiniz.

Tedaviden Beklenen Fayda	Tedavinin Olası Riskleri	Tedavi Yapılmazsa	Tedavinin Alternatifi	Ort. Süre	Kullanılacak İlaç ve Olası Yan Etkileri	Hasta İmzası
-Çiğneme, konuşma fonksiyonundaki bozuklukların giderilmesi. -Estetik sorunların giderilmesi	-Kesilen dişlerde hassasiyet -Tedavi sırasında sinirlerin açılması. -Ağız içindeki dişlerle renk farkı. -Çok etkili ısırma ve koparma yapılamaması. - Protez takıldıktan sonra soğuk ve sıcak hassasiyetinin devamı.	-Çene eklemi problemi. -Çiğneme kaybına bağlı mide problemi. -Mevcut dişlerde boşluğa doğru uzama ve kaymalar.	-İmplant -Farklı protez tipleri	15 iş günü	Lokal anestezi, anksiyete, korku, huzursuzluk, baş dönmesi, baş ağrısı, çarpıntı, hipotansiyon, hipertansiyon, bulantı, kusma yapabilir.	

#### KRON SÖKÜMÜ

Polikliniklerimizde Diş Hekimlerimiz tarafından lokal anestezi ile yapılır. Gerekliğinde aynı konuda tıbbi yardıma polikliniklerimize başvurarak alabilirsiniz.

Tedaviden Beklenen Fayda	Tedavinin Olası Riskleri	Tedavi Yapılmazsa	Tedavinin Alternatifi	Ort. Süre	Kullanılacak İlaç ve Olası Yan Etkileri	Hasta İmzası
Kaplama altındaki diş ulaşarak tedaviyi gerçekleştirmek.	-Diş kaybı -Yeni yapılan kronun kırılması. -Ağız içi yaralanma	- Diş kaybı. - Çiğneyememe. - Enfeksiyon riski.	Yoktur	5-20 dakika	Lokal anestezi, anksiyete, korku, huzursuzluk, baş dönmesi, baş ağrısı, çarpıntı, hipotansiyon, hipertansiyon, bulantı, kusma yapabilir.	

#### RÖNTGEN ÇEKİMİ

Görüntüleme Biriminde Röntgen Teknisyenlerimiz tarafından yapılır.

Tedaviden Beklenen Fayda	Tedavinin Olası Riskleri	Tedavi Yapılmazsa	Tedavinin Alternatifi	Ort. Süre	Kullanılacak İlaç ve Olası Yan Etkileri	Hasta İmzası
Doğru tanı koyarak etkin tedavi sağlamak.	Hücre mutasyonu.	-Yanlış tanı koyma. -Tedavi	Yoktur.	1 dakika		