



PERİODONTOLOJİ OPERASYONLARI HASTA BİLGİLENDİRME ve RIZA BELGESİ

Form No:

Hasta barkodunu buraya yapıştırınız

...../...../.....
.....:.....
Tıbbi Müdahaleyi Yapanın Adı Soyadı ve İmzası

Not:Hasta veya hasta yakını "Hasta İmzası" bölümüne el yazısı ile "**Okudum, anladım**" yazarak imzalayacaktır.

ĞİNGİVEKTOMİ- ĞİNGİVOPLASTİ

Polikliniklerimizde Diş Hekimlerimiz tarafından lokal anestezi ile yapılır. Gerekliğinde aynı konuda tıbbi yardıma polikliniklerimize başvurarak alabilirsiniz.

Tedaviden Beklenen Fayda	Tedavinin Olası Riskleri	Tedavi Yapılmazsa	Tedavinin Alternatifi	Ort. Süre	Kullanılacak İlaç ve Olası Yan Etkileri	Hasta İmzası
Sağlıklı (boyut, renk ve kıvamında) dişlerine kavuşma, kanamanın azalması, kötü koku, çiğneme problemlerinin ortadan kalkması, estetiğin düzeltilmesidir.	Ağrı, kanama, şişlik, enfeksiyonun yayılması, dişlerde ve çevre dokularda his kaybı, diş eti ve mukoza yaralanmaları, çenenin çıkması/kırılması, sinirlerin geçici/kalıcı zarar görmesi, çene açmada kısıtlılık, çenede ve ağız kenarlarında ezikler ve morluklar.	Dişeti büyümesinin artması, ağrı, kanama, çiğneme zorlanma, ağız kokusu, estetik problemler gelişebilir..	Alternatif tedavi yoktur.	15-30 dak.	Kanama durdurucu ajanlar, antienflamatuvar ajanlar, periodontal patlar gerekli durumlarda kullanılabilir. Bu ajanların içeriğindeki etken maddelere karşı alerjik reaksiyon gelişebilir. Lokal anestezi, anksiyete, korku, huzursuzluk, baş dönmesi, baş ağrısı, çarpıntı, hipotansiyon, hipertansiyon, bulantı, kusmaya ve alerjik reaksiyona sebep olabilir.	

VESTİBÜLASTİ

Polikliniklerimizde Diş Hekimlerimiz tarafından lokal anestezi ile yapılır. Gerekliğinde aynı konuda tıbbi yardıma polikliniklerimize başvurarak alabilirsiniz.

Tedaviden Beklenen Fayda	Tedavinin Olası Riskleri	Tedavi Yapılmazsa	Tedavinin Alternatifi	Ort. Süre	Kullanılacak İlaç ve Olası Yan Etkileri	Hasta İmzası
Hareketli protez yapımı /kullanımının kolaylaşması, dişeti çekilmesinin önlenmesi.	Ağrı, kanama, şişlik, enfeksiyonun yayılması, dişlerde ve çevre dokularda his kaybı, diş eti ve mukoza yaralanmaları, sinirlerin geçici/kalıcı zarar görmesi, çene açmada kısıtlılık (trismus), çenede ve ağız kenarlarında ezikler ve morluklar.	Hareketli protezin tutmaması/ yapılamaması, dişeti çekilmesinin devam etmesi gerçekleşir.	Alternatif tedavi yoktur.	15-30 dak.	Kanama durdurucu ajanlar, antienflamatuvar ajanlar, periodontal patlar gerekli durumlarda kullanılabilir. Bu ajanların içeriğindeki etken maddelere karşı alerjik reaksiyon gelişebilir. Lokal anestezi, anksiyete, korku, huzursuzluk, baş dönmesi, baş ağrısı, çarpıntı, hipotansiyon, hipertansiyon, bulantı, kusmaya ve alerjik reaksiyona sebep olabilir.	

FRENEKTOMİ

Polikliniklerimizde Diş Hekimlerimiz tarafından lokal anestezi ile yapılır. Gerekliğinde aynı konuda tıbbi yardıma polikliniklerimize başvurarak alabilirsiniz.

Tedaviden Beklenen Fayda	Tedavinin Olası Riskleri	Tedavi Yapılmazsa	Tedavinin Alternatifi	Ort. Süre	Kullanılacak İlaç ve Olası Yan Etkileri	Hasta İmzası
Kasın neden olduğu aşırı hareketin, diş eti çekilmesinin ve dişlerdeki ayrılmanın sonlanması. Daha rahat, sağlıklı, estetik bir protezin yapılması	Ağrı, kanama, şişlik, enfeksiyonun yayılması, dişlerde ve çevre dokularda his kaybı.	Dişeti çekilmesinin devam etmesi, iltihap, diş kaybı, protez yapımı veya kullanımının zorlaşması veya yapılamaması gerçekleşir.	Alternatif tedavi yoktur.	10-20 dak.	Kanama durdurucu ajanlar, antienflamatuvar ajanlar, periodontal patlar gerekli durumlarda kullanılabilir. Bu ajanların içeriğindeki etken maddelere karşı alerjik reaksiyon gelişebilir. Lokal anestezi, anksiyete, korku, huzursuzluk, baş dönmesi, baş ağrısı, çarpıntı, hipotansiyon, hipertansiyon, bulantı, kusmaya ve alerjik reaksiyona sebep olabilir.	

FLEP OPERASYONU

Polikliniklerimizde Diş Hekimlerimiz tarafından yapılır. Gerekliğinde aynı konuda tıbbi yardıma polikliniklerimize başvurarak alabilirsiniz.

Tedaviden Beklenen Fayda	Tedavinin Olası Riskleri	Tedavi Yapılmazsa	Tedavinin Alternatifi	Ort. Süre	Kullanılacak İlaç ve Olası Yan Etkileri	Hasta İmzası
Dişeti iltihabının azalması veya geçmesi, diş eti hastalığının durdurulması, kanamanın azalması, sağlıklı diş ve dişetlerine kavuşma,diş kayıplarının önlenmesi.	Ağrı, kanama, şişlik, enfeksiyonun yayılması, dişlerde ve çevre dokularda his kaybı, komşu dişte harabiyet, diş eti ve mukoza yaralanmaları, çenenin çıkması, sinirlerin geçici/kalıcı zarar görmesi, çene eklemine travmaya uğraması, çene açmada kısıtlılık , çenede ve ağız kenarlarında ezikler ve morluklar. Sıcak-soğuk hassasiyeti. Dişlerde aralanma, diş eti çekilmesi, dişlerin arasına gıda birikmesinde artış.Tedavi sonrası geçici bir dönem dişlerde sallanma. Diş kaybı	Dişeti iltihabı hastalığı, kemik kaybı, dişeti çekilmesi, kanama, ağız kokusu, tat bozukluğu, diş kaybı karşılaşılabilecek risklerdir.	Alternatif tedavi yoktur.	30-90 dak.	Kanama durdurucu ajanlar, antienflamatuvar ajanlar, periodontal patlar,greft membran materyali gerekli durumlarda kullanılabilir. Bu ajanların içeriğindeki etken maddelere karşı alerjik reaksiyon gelişebilir. Lokal anestezi, anksiyete, korku, huzursuzluk, baş dönmesi, baş ağrısı, çarpıntı, hipotansiyon, hipertansiyon, bulantı, kusmaya ve alerjik reaksiyona sebep olabilir.	

SERBEST DİŞ ETİ VEYA BAĞ DOKUSU GREFTİ

Polikliniklerimizde Diş Hekimlerimiz tarafından lokal anestezi ile yapılır. Gerekliğinde aynı konuda tıbbi yardıma polikliniklerimize başvurarak alabilirsiniz.

Tedaviden Beklenen Fayda	Tedavinin Olası Riskleri	Tedavi Yapılmazsa	Tedavinin Alternatifi	Ort. Süre	Kullanılacak İlaç ve Olası Yan Etkileri	Hasta İmzası
Sağlıklı dişeti oluşması, dişin daha uzun süre ağızda kalmasının sağlanması, dişeti çekilmesinin önlenmesi.	Ağrı, şişlik, enfeksiyonun yayılması, dişlerde ve çevre dokularda his kaybı, diş eti ve mukoza yaralanmaları, sinirlerin geçici/kalıcı zarar görmesi, çene eklemine travmaya uğraması, çene açmada kısıtlılık çenede ve ağız kenarlarında ezikler ve morluklar. Uzun süren kanama, şişlik, ağrı, diş kaybı. İşlem sonrası ilgili bölgede enfeksiyon ve damaktan alınan diş etinin tutmaması.	Dişeti çekilmesinin devam etmesi, iltihap, diş kaybı.	Alternatif tedavi yoktur.	30-60 dak.	Kanama durdurucu ajanlar, antienflamatuvar ajanlar, periodontal patlar, greft membran materyali gerekli durumlarda kullanılabilir. Bu ajanların içeriğindeki etken maddelere karşı alerjik reaksiyon gelişebilir. Lokal anestezi, anksiyete, korku, huzursuzluk, baş dönmesi, baş ağrısı, çarpıntı, hipotansiyon, hipertansiyon, bulantı, kusmaya ve alerjik reaksiyona sebep olabilir.	

Kıymetli hastalarımız, uygulanan tedavinin en kısa sürede amacına ulaşması için lütfen aşağıdaki önerileri dikkate alın.

- Operasyon sonrası ilk iki saat boyunca herhangi bir şey yemeyiniz ve tükmürmeyiniz. Operasyon sonrası 24 saat boyunca sıcak, sert yiyecek ve içeceklerden uzak durunuz
- Güneş altında kalmayınız ve istirahat ediniz. Sıcak su ile banyo yapmayınız.
- Yumuşak, ılık veya soğuk yiyecekler tüketiniz. Operasyon bölgesi ile çiğnemeyiniz.
- Sıcacığın kanamayı arttıracağını unutmayınız. Operasyon bölgesi tarafındaki yanak üzerinden 24-48 saat boyunca beşer dakika arayla iki dakika sürecek şekilde buz uygulaması yapınız.
- Ağrı kesiciler dahil, Hekiminiz tarafından reçete edilmeyen hiçbir ilacı kullanmayınız.
- Yara üzeri koruyucu pat (macun) ile kapatıldı ise macunun bulunduğu bölgeyi fırçalamayınız. Tedavi yapılmayan bölgeyi ikinci günden itibaren fırçalayınız.