



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Doküman Kodu: HD.RB.02  
Yayın Tarihi : 03.01.2018  
Revizyon Tarihi:  
Revizyon No : 00

**ÇOCUK HASTA BİLGİLENDİRME ve RIZA BELGESİ**

Değerli hasta yakınım; bu formun amacı, çocuğunuza konulan teşhis ve yapılacak tedaviler hakkında size bilgi vermek ve bilinçli bir şekilde tedaviyi kabul ettiğiniz ve onayladığımızı belirtmektir. Dikkatle okuyunuz ve anlamadığınız kısımlar için doktorunuzdan yardım isteyiniz. Tedaviye başlamadan önce çocuğunuzun astım, hiperaktivite, zihinsel bozukluk gibi özel durumları ile hastalıkları, kullandığı ilaçlar ve bulaşıcı hastalıkları hekiminizle paylaşmanız zorunludur.

\* Çocuğun kendisini bir otorite olarak görmesini ve tedaviye katılımını sağlamak amacıyla çocuk ile hekim arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde kurulabilmesi için velilerin bekleme salonunda beklemeleri gerekmektedir. Hekim gerekli gördüğünde veliyi çağırabilir. Tedavilerin başarısında veli-hekim uyumunun önemi büyüktür.

\* Çocukların tedaviye ikna edilemediği durumlarda, kullanılan aletlerin hızlı, devirli ve tehlikeli olması dolayısıyla, oluşabilecek sakıncalar düşünülerek tedavi için ısrar edilmemelidir.

Hasta barkodunu buraya yapıştırınız

...../...../.....  
.....:.....  
Tıbbi Müdahaleyi Yapanın Adı Soyadı ve İmzası

Form No:

Not:Hasta velisi "Hasta İmzası" bölümüne el yazısı ile "Okudum,anladım" yazarak imzalayacaktır.

**DIŞ ÇEKİMİ**

Polikliniklerimizde Diş Hekimlerimiz tarafından lokal anestezi ile yapılır. Gerekliğinde aynı konuda tıbbi yardıma polikliniklerimize başvurarak alabilirsiniz.

Tedaviden Beklenen Fayda	Tedavinin Olası Riskleri	Tedavi Yapılmazsa	Tedavinin Alternatifi	Ort. Süre	Kullanılacak İlaç ve Olası Yan Etkileri	Hasta İmzası
-Ağrının gidermek. -Enfeksiyonu gidermek. -Ortodontik tedavi için ağız hazırlamak.	-Çocuk hareket ederse dil, dudak ve yanakta kesikler oluşabilir. -Çekim bölgesinde ağrı, şişlik ve kanama. -Çene eklemının zedelenmesi. -Komşu dişte ve dolgusunda hasar. -Altıtan gelen daimi diş zarar vermemek için bazen küçük süt dişi kökleri bırakılabilir. -Çekilmiş dişin çocuğun refleksiyle yutulması.	-Yaygın enfeksiyon görülür. -Ağrı artar.	Yok	10 dakika.  Kompli kasyon durumunda uzayabilir.	Lokal anestezi sonrası uyuşukluk 2-4 saat arası sürer. 12 yaş altı çocuklarda süt dişinin sürmesine engel değildir. -Korku, heyecan ve açlığa bağlı bayılma, yüzde renk değişikliği. -Ağız açmada güçlük ve anestezi bölgesinde ağrı ve şişlik. -Komşu sinirler etkilendiğinde geçici yüz felci ve şaşılık, yutkunma güçlüğü, dil uyuşukluğu. - Hasta anestezi bölgeyi kaşır, ısırır, çiğnerse travmatik yaralanmalar oluşabilir. -Anafilaktik şok.	

**DOLGU ve KANAL TEDAVİSİ**

Polikliniklerimizde Diş Hekimlerimiz tarafından lokal anestezi ile yapılır. Gerekliğinde aynı konuda tıbbi yardıma polikliniklerimize başvurarak alabilirsiniz.

Tedaviden Beklenen Fayda	Tedavinin Olası Riskleri	Tedavi Yapılmazsa	Tedavinin Alternatifi	Ort. Süre	Kullanılacak İlaç ve Olası Yan Etkileri	Hasta İmzası
-Dolgu ile diş harabiyetini gidermek ve estetiği sağlamak. -Kanal Tedavisi ile kök kanallarını temizleyerek doldurmak. -Değişme zamanına kadar süt dişlerinin ağızda kalmasını sağlamak. -Kanal tedavisi çekim öncesi uygulanabilecek son tedavidir.	-Yüksek devirli aletlerle işlem yapıldığından, çocuk hareket ederse dil, dudak ve yanakta kesik oluşabilir. -Kanal aletleri ani refleksle yutulabilir. -Kanal içinde alet kırılabilir. -Kanal yıkama solüsyonuna karşı hassasiyet olabilir. -Büyük çürüklerde dolgu sonrası ağrı olabilir. -Kanal tedavisi sonrası 1-7 gün arası ağrı olabilir. -Kanal tedavisi dişin bir daha çürümeyeceği anlamına gelmez. -Küçük yaştaki çocuklarda tedavi sırasında çocuğun tedaviyi reddetmesine bağlı olarak tedavinin yarım kalması söz konusu olabilir.	-Diş kırılır ve çökür. -Enfeksiyona yol açar. -Ağrı ve ağız kokusu olur.	Diş çekimi.	Dolgu 30 dakika  Kanal Tedavisi 60 dakika	Lokal anestezi sonrası uyuşukluk 2-4 saat arası sürer. 12 yaş altı çocuklarda süt dişinin sürmesine engel değildir. -Korku, heyecan ve açlığa bağlı bayılma, yüzde renk değişikliği. -Ağız açmada güçlük ve anestezi bölgesinde ağrı ve şişlik. -Komşu sinirler etkilendiğinde geçici yüz felci ve şaşılık, yutkunma güçlüğü, dil uyuşukluğu. - Hasta anestezi bölgeyi kaşır, ısırır, çiğnerse travmatik yaralanmalar oluşabilir. -Anafilaktik şok.	

**YER TUTUCU ( SABİT VE HAREKETLİ)**

Polikliniklerimizde Diş Hekimlerimiz tarafından yapılır. Gerekliğinde aynı konuda tıbbi yardıma polikliniklerimize başvurarak alabilirsiniz.

Tedaviden Beklenen Fayda	Tedavinin Olası Riskleri	Tedavi Yapılmazsa	Tedavinin Alternatifi	Ort. Süre	Kullanılacak İlaç ve Olası Yan Etkileri	Hasta İmzası
-Çekim boşluğunun korunarak alttan gelecek daimi dişin düzgün çıkmasını sağlamak. -Fonksiyon ve estetiği sağlamak.	-Çocuk eliyle ve diliyle sabit yer tutucunun yerinden çıkmasına neden olursa yutulabilir. -Hareketli yer tutucunun tutucu telleriyle oynayarak tutuculuğunu bozabilir. -Yer tutucular çok etkili çiğneme ve koparma yapamazlar.	-Yer kaybı ve çapaşıklık oluşması görülebilir. -Çiğneme ve konuşmada bozukluk olabilir.	Yok	10-15 gün		

**FLOR ve FISSUR SEALANT**

Polikliniklerimizde Diş Hekimlerimiz tarafından yapılır. Gerekliğinde aynı konuda tıbbi yardıma polikliniklerimize başvurarak alabilirsiniz.

Tedaviden Beklenen Fayda	Tedavinin Olası Riskleri	Tedavi Yapılmazsa	Tedavinin Alternatifi	Ort. Süre	Kullanılacak İlaç ve Olası Yan Etkileri	Hasta İmzası
-Flor ile dişlerin çürüğe karşı kuvvetlenmesi. -Fissur Sealant ile dişlerin çukur alanlarının akışkan maddeler ile doldurularak çürüğe karşı korumak.	-Flor veya fissur işlemi sırasında uygulanan asit jel yutulursa mide bulantısı ve kusma olabilir.	Dişler çürüğe karşı korunamayabilir.	Yok	10 dakika		