



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Doküman Kodu: HB.RB.01

Yayın Tarihi : 03.01.2018

Revizyon Tarihi:

Revizyon No : 00

ANESTEZİ RIZA BELGESİ

1. **Anestezi Nedir?**

- GENEL ANESTEZİ: geçici bilinç kaybı ile birlikte duyu, ağrı, hareket fonksiyonlarının ortadan kalkmasıdır.
- BÖLGESEL ANESTEZİ: vücudun bir parçasının duyusunun ortadan kaldırılmasıdır.

2. **Anestezi Nasıl Uygulanır?**

- GENEL ANESTEZİ: damar içine verilen anestezi ilaçları ile uygulanır. Hasta uyuduğu zaman solunum desteği nefes borusuna takılan tüp (endotrakeal entübasyon) ile sağlanır. Hasta ameliyat süresince, hayati fonksiyonları ve oluşabilecek sorunlar açısından anestezi uzmanları izlenir.
- BÖLGESEL ANESTEZİ: omurilik veya sinir çevresine anestezi (ağrı duyusunu azaltan) madde verilerek uygulanır.

3. **Anestezi Riskleri:**

(Aşağıda anlatılan risklerin gerçekleşme olasılığı oldukça düşüktür.)

- Operasyona alınacak hastanın ameliyathaneye girişinden, ameliyat sonrası dönemde dahil mevcut kalp akciğer sistem hastalıkları nedeniyle yada cerrahi ve anestezi stresine bağlı nedenlerle myokard infarktüsü (kalp krizi) geçirebilir.
- Anestezi ilaçlarına bağlı olarak anafaksi (alerjik reaksiyon), Kardiyak arrest (kalp durması) gelişebilir, tedaviye cevap vermeyip kaybedilebilir.
- Anestezi başlangıç döneminde çene çıkabilir, dişler ve protezler kırılabilir.
- Anestezi ilaçlarına bağlı olarak böbrek yetmezliği, karaciğer harabiyeti, kalp yetmezliği, akciğer ödemi görülebilir.
- Ameliyatın türüne bağlı olabileceği gibi hastanın mevcut hastalıklarına, kilosuna, kullandığı ilaçlara, yaşına bağlı olarak yağ, pıhtı, hava embolisi gelişebilir ve sonuçta felç ve ölüm görülebilir.
- Çok nadir olmakla birlikte hastanın tetkik edilemeyen özelliğine bağlı ve bazı anestezi ilaçları ile tetiklenebilen çok yüksek ateşle başlayıp ölüme sebebiyet veren hipertermi (ateş yükselmesi) görülebilir.
- Hamilelikte anestezi bebek için risklidir.
- Omurilik içine yapılan bölgesel anestezilerde (epidural, spinal, caudal) enfeksiyon, baş ağrısı, kısmi felç, yüz felci gelişebilir. Kalp yetmezliği gelişebilir.
- Sinir çevresine yapılan bölgesel anestezilerde, duyu kaybı, kısmi felç gelişebilir.
- Solunum desteği için takılan tüp nedeniyle dudak, ağız, dil, boğaz, soluk borusu, akciğerler zarar görebilir.
- Tüp çıkarıldıktan sonra geçici boğaz ağrısı ses kısıklığı, yutma zorluğu olabilir.

4. **Anestezi Alternatif Tedavileri Ve Riskleri:** Bilinen bir alternatif uygulama yöntemi yoktur.

5. **Anestezi Uygulanmazsa Neler Gelişir?:** Yapılacak ameliyat gerçekleştirilemez.

6. **Anestezi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?**

- * **Anestezi uygulamasından sonra:** anestezi uzmanınız tarafından aksi belirtilmemişse, en az 6 saat ağızdan herhangi bir sıvı, gıda vb. alınmayınız.

7. **HASTAYA ÖZEL DURUMLAR:**

.....
.....
.....
.....

Anestezi Uzmanı

Diş Hekimi

Hasta- Hasta Yakını

.....

.....

.....